

МЕНІНГОКОКОВА ІНФЕКЦІЯ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНА

Менінгококова інфекція – гостра інфекційна хвороба, яка характеризується широким діапазоном клінічних проявів від безсимптомного бактеріоносійства до близькавичних форм з високою летальністю, яка досягає 70-80 процентів.

Менінгококовій інфекції притаманна зимово-весняна сезонність. Період від зараження до перших клінічних симптомів триває в середньому 5-7 діб. Джерелом інфекції є хвора людина чи бактеріоносій. Механізм передачі – повітряно-крапельний: при чханні, кашлі, близькому контакті з хворим. Менінгокок – збудник хвороби - малостійкий у зовнішньому середовищі, гине через кілька годин при кімнатній температурі.

Найбільш небезпечним для зараження є хворі з катаральними явищами – менінгококовим назофарингітом, першими ознаками якого є підвищення температури, головний біль, біль у горлі, сухий кашель, закладеність носа. Менінгокок може проникати у кров, тоді маємо тяжкі генералізовані форми – менінгіт та менінгококцемію (загальне ураження усіх органів і систем організму людини менінгококовою інфекцією).

Менінгококовий менінгіт починається раптово з різкого підйому температури до 40-41° С, блілоти, головного болю. Головний біль сильний до нестерпності, підсилюється при зміні положення тіла. Хворі приймають характерну позу, яка полегшує головний біль. Вони лежать на боку з закритими очима і закинутою назад головою. Хворі негативно сприймають доторкання до шкіри, не переносять бальові подразнення, у них підвищена чутливість до гучних звуків, яскравого світла.

При менінгококцемії захворювання починається також гостро з різкого підвищення температури до 39-41° С, ознобу, головного болю, болю в суглобах, м'язах, блілоти. Характерним для менінгококцемії є геморагічний зірчастий висип неправильної форми, з чіткими контурами, що виступає над рівнем шкіри. Найчастіше висип локалізується на сідницях, задній поверхні стегон і гомілок. Він з'являється рано, у перші години захворювання, швидко підсипає, стає рясним і зливається на тілі різко блідої шкіри. У хворого виникають носові кровотечі, кривава блілота. Хворі на генералізовані форми менінгокової інфекції підлягають обов'язковій екстреній госпіталізації у спеціалізоване відділення інфекційного стаціонару, де їм надається кваліфікована медична допомога.

При появі перших ознак цієї небезпечної хвороби необхідно негайно викликати лікаря. Чим раніше розпочати лікування, тим більше шансів на одужання.

Міське управління охорони здоров'я

Міський центр здоров'я

Міська санепідемстанція

